


子癩前症—

# 妊娠高血壓和早產



懷孕11-13<sup>+6</sup>週進行子癩前症早期篩檢，可降低妊娠高血壓對媽媽和寶寶的威脅。

2005年  
致死率  
**12%**

死亡成長率 **2%**

2014年  
致死率  
**14%**

因子癩前症早產  
260萬人/年

全球孕婦  
死亡原因No.3  
妊娠高血壓

因子癩前症成死胎  
1,000寶寶/年

資料來源：Preeclampsia Foundation(<http://www.preeclampsia.org/>)

## 案例一 吳淡如早產妊娠毒血症剖腹 雙胞胎保住1女

作家兼節目主持人吳淡如在中西醫調理下，以44歲高齡懷了雙胞胎。但在懷孕之後出現高血壓、水腫，甚至全身抽筋等症狀，經產科醫師診斷為子癩前症，一女已於20週時胎死腹中，在29週產檢時又發現有早產現象，為了母體及胎兒的生命安全著想，緊急剖腹產下910公克女嬰。吳淡如出院後仍不停打嗝、腹瀉、氣喘，且血壓過低，醫生也表示未來可能有肺水腫、腦水腫等病狀。

資料來源：自由時報(2009.6.17)

## 案例二 雙胎高血壓 彭佳慧產後大出血

知名歌手彭佳慧在2011年11月底於中山醫院剖腹生下第二胎雙胞胎女兒，在產檢時就有「子癩前症」的尿蛋白及高血壓等徵兆的她，在生產當晚突然無法排尿，加上大量失血及血壓飆升，醫生診斷她罹患「子癩前症」，緊急將她送往加護病房，後為她輸血小板、血紅素、血液共3000c.c.，經過兩天才脫離險境。

資料來源：蘋果日報(2011.12.2)

## Q1. 我需要做子癩前症篩檢嗎？

### 子癩前症篩檢自我評估表

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初次懷孕         | <input type="checkbox"/> 本身患有糖尿病      |
| <input type="checkbox"/> 曾患子癩前症       | <input type="checkbox"/> 體重過重         |
| <input type="checkbox"/> 有慢性高血壓或慢性腎病  | <input type="checkbox"/> 患有紅斑性狼瘡      |
| <input type="checkbox"/> 曾有血栓病史       | <input type="checkbox"/> 高齡產婦(超過40歲)  |
| <input type="checkbox"/> 做試管嬰兒等體外受孕狀況 | <input type="checkbox"/> 有其他因素讓您想進行篩檢 |
| <input type="checkbox"/> 家族有人曾患子癩前症   |                                       |




如果您**符合任一項狀況**，  
建議您在第一孕期時進行篩檢，  
以避免子癩前症威脅您  
和寶寶的健康！

## Q2. 子癲前症 (妊娠毒血症) 會威脅媽媽和寶寶健康？



## Q3. 早期篩檢及預防，真的可以降低子癲前症的風險嗎？

- 懷孕11-13<sup>+6</sup>週即可預測疾病風險係數，不必等到疾病發生。
- 及早判斷風險，讓您可與醫師討論如何控制風險，降低子癲前症機率。



▲ 16周前開始控制風險，可有效降低罹患子癲前症的機率

## Q4. 簡單快速的抽血檢查，我需要準備哪些東西？

子癲前症篩檢，您需要的有.....

- 檢測同意書
- 胎兒超音波照片
- 勾選是否患有特定疾病
- 3~5c.c.母體血液
- 測量血壓及子宮動脈血流